

## 【乾癬 生物学的製剤一覧】

商品名	ヒュミラ	ステラーラ	コセンティクス	トルツ	ルミセフ	スキリージ	シムジア	トレムフィア	レミケード
一般名	アダリムマブ	ウステキヌマブ	セクキヌマブ	イクセキズマブ	プロダルマブ	リサンキズマブ	セルトリズマブ	グセルクマブ	インフリキシマブ
作用機序	TNF $\alpha$ 阻害	IL-12とIL-23阻害	IL-17A阻害	IL-17A阻害	IL-17受容体A阻害	IL-23阻害	ペグ化TNF $\alpha$ 阻害	IL-23p19阻害	TNF $\alpha$ 阻害
投与方法	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射	皮下注射	点滴
1回の投与量	初回80mg (2本)  以降 2週間隔で 40mgまたは80mg (1本または2本)	初回45mg (1本)  4週後45mg (1本)  以降 12週間隔で45mg (1本)	初回300mg (2本)  5週まで 週1回300mg (2本)  以降 4週間隔で300mg (2本)	初回160mg (2本)  12週まで 2週間隔で80mg (1本)  以降 4週間隔で80mg (1本)	初回210mg (1本)  2週まで 週1回210mg (1本)  以降 2週間隔で210mg (1本)	初回150mg (2本)  4週後150mg (2本)  以降 12週間隔で150mg (2本)	初回400mg (2本)  2週、4週後400mg (各2本)  ①200mg(1本) ②400mg(2本)	初回100mg (1本)  4週後100mg (1本)  以降 8週間隔で100mg (1本)	初回 体重1kgあたり5mg  2週、6週後も同量  以降 8週間隔で投与 ※6週以後増量及 び投与間隔の短縮 可能
投与間隔	2週間	12週間	4週間	4週間	2週間	12週間	①2週間 ②4週間	8週間	8週間
自宅での自己注射 (×の場合は 病院にて皮下注射)	○	×	○	○	○	×	○	×	×
自己注射可能な場合 受診1回当たりの 投与量(3ヶ月分)	3~6本	—	6本	3本	6本	—	6本	—	—